

2013年1月12日,“郎朗2013南京新年音乐会”在南京奥体中心体育馆举行。音乐会上,郎朗演奏了肖邦、舒伯特等名家的数十首世界名曲,并与100名琴童同台演奏。高邮女孩周佳苗,是这100名琴童中的一位,幸运地与郎朗在南京奥体中心体育馆共同奏响了迎接新春的交响曲——

高邮琴童周佳苗与郎朗同台演奏



周佳苗(后排右四)与郎朗(后排左六)在演出结束时合影

近日,记者采访了这位幸运的女孩周佳苗。说到与钢琴大师郎朗同台演出的经历,10岁的周佳苗还沉浸在喜悦之中。“就像做梦一样,见到自己的偶像郎朗,真的很开心!”眼前这个带着粉色眼镜、文静的女孩说到郎朗时眉飞色舞,自豪与兴奋之情溢于言表。而陪伴在一旁的妈妈王金霞眼中则充满了疼爱,她告诉记者,女儿这几天可累坏了。

11日晚,周佳苗在南京奥体中心体育馆彩排到深夜11点多钟;12日晚,周佳苗演出结束后于13日凌晨2点多钟赶回高邮;13日晚,周佳苗复习功课到14日凌晨1点多钟。

“辛苦点算什么呀,我与郎朗同台演出了耶!”周佳苗撒娇道。“真是这样,能与郎朗这位世界级的钢琴大师同台演出是多少琴童的梦想啊!”王金霞感慨万分。这样的机

会,对于周佳苗来说,真是千载难逢。

2012年12月22日,王金霞得知郎朗在2013南京新年音乐会上,将与百名琴童同台演奏,而扬州有7个名额。这7个名额不是想要就有,要通过选拔,选拔赛定于2012年12月30日在扬州举行。

得知这一消息后,王金霞立即告诉了女儿周佳苗,周佳苗非常激动。虽然女儿以优秀的成绩通过了钢琴十级,但是这一年来由于功课较紧,练琴的时间偏少,加之扬州地区高手如云,女儿能不能选上呢?为了稳妥起见,王金霞对女儿说:“你就选一首拿手的曲目参加扬州的选拔吧!”“那不行,我想学新曲目——《浏阳河》。”身为钢琴教师的王金霞深知这首曲目的难度,女儿选择这首曲目去应战,胜负难料。不过,既然女儿决定了,就要全力以赴。在一个星期的时间里,周佳苗一边学习,一边跟随妈妈苦练,每天至少练习两个小时。

带着妈妈的鼓励,带着满心的期待,2012年12月30日,在扬州的选拔赛上,周佳苗以一曲《浏阳河》征服了在场评委,获得了与郎朗同台演出的机会。

周佳苗与郎朗同台演出的消息在她就读的实验小学五(六)班传开了,同学们都羡慕地说:“一定要送我一张你与郎朗的合照!”班主任范老师鼓励她说:“不要紧张,发挥出你应有

的水平。”

在南京奥体中心体育馆,面对上万名观众,周佳苗等百名琴童与郎朗共同演奏了《拉德斯基进行曲(四手联弹)》和《春天在哪里》两首曲目。周佳苗告诉记者,郎朗就坐在离她不远的前方,她既激动又紧张,稍不留神弹错了几个音。“郎朗演奏得好吗?”“真好,专注而投入,表情特别丰富,手指触键既快又清晰,这段时间脑子里经常浮现那天演出时的场景,真让我难忘!”周佳苗回想起那天的情景仍是那么激动。

郭玉梅 文/摄



责任编辑 张云

五粮精品

更香更醇

天貝春

五粮液股份有限公司优质产品

高邮总代理：鑫梅酒业（花湾路）

电话：0514 - 82678369 15190427449

学校结核病防控知识

结核病是一种可以防治的慢性传染病。它是因机体免疫力下降,感染结核杆菌后所致,全身各个器官均可受累,但以肺部最为常见。本病在《中华人民共和国传染病防治法》中列为乙类传染病进行专病管理。人群普遍易感,15-54岁青壮年发病居多,占80%左右,全年均可发病。病原体为结核分枝杆菌,在被感染结核菌后,约1/10的人终身有可能发病。

近年来,全球结核病疫情呈上升趋势。据我国统计资料表明,结核病是目前在校影响学业、因病休学的重要疾病之一,是危害学生健康的常见病。因此,广大师生对结核病防治知识要有所了解,“寓预防于治疗”,保证顺利完成学业。

1、什么是结核病和肺结核病?
结核病是人体感染结核杆菌后,当自身抵抗力下降时所引起的慢性传染病,可以侵害人体的各种器官。当侵害部位在肺部时称为肺结核病。结核病患者中大约80%以上是肺结核。

2、结核病有哪些危害性?
(1)对个人的危害:结核病可侵犯人体多个系统,严重损害身体健康,影响学习、工作和生活。如不正确治疗,可能导致治疗失败,造成结核耐药,甚至死亡。
(2)对家庭的危害:一是会传染家人(尤其是儿童),二是造成经济损失。
(3)对社会的危害:一个未经治疗的涂阳肺结核患者1年内可以传播10-15人。

3、健康人如何在日常生活中预防肺结核?

由于结核菌的感染是导致本病发生的直接原因,因此应尽量减少与肺结核病人,特别是活动性肺结核病人接触。此外,生活有常,饮食有节,经常呼吸新鲜空气,保持乐观情绪,经常参加体育运动,增强体质有利于预防结核病的产生。新生儿出生后立即接种卡介苗,对预防婴幼儿结核病有一定作用。

4、控制结核病最有效的措施是什么?
积极发现和治愈传染性肺结核病人,是当今结核病控制最有效、最符合成本效益的措施。实施直接面视下短期疗法能使结核病传染源短期内失去传染性,避免多种耐药病人发生、显著地减少复发和得到彻底治愈。

5、结核病是如何传播的?
咳嗽传播是肺结核传播的主要途径。此外传染性肺结核患者如果随地吐痰,带有结核菌的痰经过干燥后,形成微小的飘浮尘埃,人们吸入后也可能造成感染。因此咳嗽喷嚏掩口鼻,不随地吐痰的良好习惯可以减少结核的传播。

6、结核病人都有传染性吗?
并不是所有结核病人都有传染性,涂片阳性的肺结核患者才是结核病的主要传染源。

7、接触结核病人就一定会得结核病吗?
健康人受到结核菌感染后,不一定发生结核病,是否发生结核病,主要与感染结核菌的数量和毒力以及身体抵抗力有关,受感染的人群在一生中发生结核病的概率大约为10%。

8、哪些人是结核病的易感人群?

一般来说,所有的人都是肺结核的易感人群。而免疫力低下的人感染结核菌容易发生结核病,如幼儿、营养不良、老人、尘肺、糖尿病患者、HIV感染及长期使用免疫抑制剂者等。

9、肺结核的常见症状有哪些?
以咳嗽咳痰2周以上或痰中带血丝最为常见,其他常见的症状还有低烧、夜间盗汗、疲乏无力、体重减轻等。

10、为何学校易出现结核病爆发?
一是因为学生学习压力大,又处于发育阶段,个体的免疫力较低,自我保护意识较差,更容易感染上结核杆菌;
二是由于学校是相对封闭场所,人群聚集,接触面广,结核病又是通过呼吸道传播的,一旦有人发病,很容易在学生间造成相互传播;

三是因为部分患病学生担心耽误学习,出现症状后不及时就医,结果不但延误了自己的治疗,还导致在同学中的传播。

11、学校一旦发现肺结核病人怎么办?
首先,要正确引导、不要恐慌,先动员患者离开集体环境到结核病诊治定点医院进行积极的诊断和治疗,并热情照顾患者。

其次,病人的密切接触者应到结核病诊治定点医院进行检查,发现患者应及时治疗;如无症状,3-6个月后最好再进行一次检查。如PPD强阳性,则应在医生指导下采取预防性服药;其他感染者应注意在出现肺结核症状时及时检查。

再次,对病人的居住场所做一次彻底的消毒,定时开窗通风,保持室内空气新鲜。做好病人痰液的消毒处理。

最后,督促病人按时全程服药,定期查痰,在痰菌未阴转前,应采取适当隔离。

12、学校如何防止结核病聚集性疫情?
学校预防肺结核病的关键措施是早期发现病人,并及时给予合理的化疗。教育学生了解结核病的常见症状,如何及时发现和正确治疗结核病,提高自我保护意识。并教育学生尤其是毕业班学生要注意劳逸结合,防止过度疲劳。

学校应积极开展爱国卫生运动,加强学校环境卫生的清扫和消毒,特别要注意教室和集体宿舍经常开窗通风,保持空气清新。

13、学生肺结核病患者何时能正常学习?
菌阳肺结核患者,以及X线显示肺病灶范围广、伴空洞或具有明显肺结核症状的菌阴患者,应由结核病定点医院医疗机构开具休学诊断证明,休学后全程正规治疗。治疗结束后经医院开具相关证明后再入学。

对于无明显肺结核症状的菌阴患者,身体状况较好,可以一边学习,一边治疗。在校治疗的病例,实行属地结核病防治机构与学校相结合的方式全程督导治疗管理。

14、出国上学需要进行哪些结核病检查?
多数工业化国家对留学超过3个月以上的学生要求提供体检报告,体检要求因不同国家而异,一般要求实施X线胸片检查,对X线检查异常者还须进行痰结核杆菌检查。

对于短期访问、交流学习,多数国家并不要求提供体检表。

王正光

疾控之窗

JIKONG ZHI CHUANG

高邮市疾病预防控制中心 主办

联系电话:84643079 主持人:竺健 栏目编辑:黄亚民